

Diarre hos minkene i perioden omkring 1. juli (2016)

Hvordan ser diarre ud i minkfarmene ?

Nogle gange tilkaldes jeg p.g.a. diarre i minkfarmene, hvor jeg synes at der ikke er nogen grund til at behandle. Andre gange anbefaler jeg ved rådgivningsbesøg at behandle på trods af, at minkavleren ikke har set diarre som noget problem.

Der er ikke særligt almindeligt at hvalpene dør af diarre, men omkring 1. juli opstår tilfælde, hvor tiltagende utrivelighed og forhøjet dødelighed er en del af diarre problemet.



Ovenstående billede (d. 290616) er fra en minkfarm med ca 1000 tæver, hvor dødeligheden på 1-2 hvalpe / dag pludselig stiger til 12-15 døde / dag. Alle døde minkhvalpe er tydeligt afmagrede og mange er snavsede omkring endetarmsåbningen.

Foderforbruget er OK, men mange af hvalpene synes for små. Der er en del diarre. Mest udflydende brun afføring med enkelte gule, grønne og brun/orange klatter.

Altså et tilfælde, hvor dødeligheden er helt afgørende for indsættelse af behandling. I dag d. 1 juli altså kl. 8.....altså 48 timer efter besøg er dødeligheden igen faldet til 1-2, hvalpene er allerede blevet mere runde og afføringen er nu formet og begyndt at stakke op i gyllerenderne.

Et helt andet tilfælde fra i går d. 30. juni 2016:

Her er der næsten ingen dødelighed, og alle hvalpene er meget store og trivelige, men afføringen er forandret over de seneste par dage og ser nu sådan ud:



Alle 4 billeder er taget under bure i 5 fag i en to rækket hal:



Altså et eksempel på, at det er alvorligheden (blodig og voldsom diarre) af forandringerne af gødningen samt udbredelsen i farmen, der afgør at behandling er absolut nødvendig.

Ivan Christiansen, minkdyrlæge